

Aktuelle Studien

Studienzentrum Thoraxonkologie

Stand Juli 2026

Nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)

Studie	Studienart	Stadium	Therapielinie
ARTEMIDE-02 / -03 - AstraZeneca	Phase III	Stad. IV / PD-L1 >1	First Line
TROPION-Lung-14 - AstraZeneca	Phase III	Stad. IV	First Line - EGFR
SOHO-02 - Bayer	Phase III	Stad. IV	First Line - HER2 Mutation
ANTELOPE - IKF Frankfurt	Phase II	Stad. IV	First Line
KRYSTAL-4 - BMS	Phase III	Stad. IV	First Line - KRAS G12C
BMS KRYSTAL-7	Phase II/III	Stad. IIIB-IV	First Line
TROPION-Lung17	Phase III	Stad. IIIC-IV	Second Line - TROP2
NAUTIC	NIS	Stad. IV	First Line
REZILIENT-4	Phase III	Stad. IB-IIIA	Adjuvant / EGFR Exon 20

Studien in Vorbereitung	Studienart	Stadium	Therapielinie
RESQ201A	Phase III	Stad. IV	Second Line
IZABRIGHT-Lung 01	Phase II/III	Stad. IV	Second Line / EGFR
BMS CA052-1000	Phase II	Stad. IV	First Line
MARS-light-11	Phase III	Stad. IV	Second Line
REDUCE- LUNG	Phase III	Stad. IV	First Line
ROSETTA Lung-2	Phase III	Stad. IV	First Line / PD-L1 ≥ 50%

Pleuramesotheliom

Studie	Studienart	Stadium	Therapielinie
eVOLVE- Meso 2 AstraZeneca	Phase II	Stad. IV	First Line
Tiger Meso	NIS	Stad. IV	Zusätzlich zur Routinebehandlung

Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC)

Studie	Studienart	Stadium	Therapielinie
CRISP	Register	I-IV	Register

In Vorbereitung	Studienart	Stadium	Therapielinie
ZL-1310-003 – Zai-Lab	Phase III	Stad. IV	Second/Third Line
AbbVie M23-384	Phase III	Stad. IV	Second Line
EMBOLD	Phase III	Stad. IV	Second Line
BL-M14D1-LC-301	Phase III	Stad. IV	First Line
REPLAT	Phase II	Stad. IV	First Line/Progress/ Rechallenge-Platin

Onkologische Studien NSCLC

ARTEMIDE-02 - AstraZeneca

Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische, globale Phase-III-Studie mit Rilvegostomig oder Pembrolizumab in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom, deren Tumore PD-L1 exprimieren (ARTEMIDE-Lung02)

ARTEMIDE-03 - AstraZeneca

Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische, globale Phase-III-Studie mit Rilvegostomig oder Pembrolizumab in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), deren Tumore PD-L1 exprimieren (ARTEMIDE-Lung03)

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC Stadium IV ▪ PD-L1 >1% ▪ Körpergewicht ≥ 30 kg ▪ ECOG: 0-1	▪ Onkogenen Treiber, z.B. EGFR, ALK, ROS1 ▪ Unbehandelte, symptomatische Hirnmetastasen

Tropion-Lung-14 - AstraZeneca

Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zu Osimertinib mit oder ohne Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) als Erstlinienbehandlung bei Teilnehmern mit EGFR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC Stadium IIIB -IV ▪ EGFR Mutation (z.B. Ex19del or L858R) ▪ ECOG: 0-1	▪ Kurative Behandlungsmöglichkeit (OP oder Radiochemotherapie) ▪ Anderes Malignom in den letzten 3 Jahren ▪ Ausgedehnter Pleuraerguss oder Aszites

SOHO-2 - Bayer

Eine Phase-3-Studie mit BAY 2927088 im Vergleich zur Standardtherapie als Erstlinientherapie für fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) mit HER2-Mutationen

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC Stadium IV ▪ Aktivierende HER2-Mutation ▪ ECOG: 0-1	▪ Anderes Malignom in den letzten 5 Jahren ▪ Andere therapierbare Mutationen ▪ Pneumonitis / ILD

ANTELOPE - IKF Frankfurt

Atezolizumab/Carboplatin/nab-Paclitaxel vs. Pembrolizumab/Platinum/Pemetrexed in metastasiertem, TTF-1 negativem NSCLC Adenokarzinom

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC Adeno Ca. Stad. IV ▪ ECOG 0-1 ▪ PD-L1 TPS Score < 50%	▪ EGFR / ALK ▪ Vortherapie für Stadium IV ▪ Unbehandelte / symptomatische Hirnmetastasen (14 Tage stabil + Steroide ≤ 10 mg vor Start erlaubt)

KRYSTAL-4 - BMS

Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zum Vergleich von Adagrasib plus Pembrolizumab plus Chemotherapie mit Placebo plus Pembrolizumab plus Chemotherapie bei Teilnehmern mit bisher unbehandeltem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit KRAS-G12C-Mutation.

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC mit KRAS G12C Mutation ▪ Inoperabel, nicht für eine def. Radiochemotherapie geeignet ▪ ECOG 0-1	▪ Plattenepithelkarzinom ▪ Vorangegangene Behandlung im metastasierten Stadium ▪ EGFR, ALK, BRAF V600E, HER2, MET exon 14, ROS 1, NTRK1/2/3 Mutation/Alteration ▪ Unbehandelte oder symptomatische Hirnmetastasen ▪ Weiteres Malignom in den letzten 2 Jahren

TROPION- Lung 17

A Phase III, Randomised, Open-Label, Multicentre Study of Datopotamab Deruxtecan or Docetaxel in Previously Treated TROP2-positive Advanced or Metastatic Non-squamous Non-Small Cell Lung Cancer Without Actionable Genomic Alterations (TROPION-Lung17)

Inclusion	Exclusion
▪ Adeno CA ▪ TROP2 positiv ▪ Vorbehandlung mit anti-PD-1/anti-PD-L1 Monotherapie oder als Kombination ,it Platin	▪ EGFR, ALK, BRAF V600E, HER2, MET exon 14 skipping, ROS 1, NTRK1/2/3, RET, KRAS G12C Mutation/Alteration ▪ Weiteres Malignom in den letzten 3 Jahren

KRYSTAL-7 – Mirati

A Phase 2 Trial of Adagrasib Monotherapy and in Combination with Pembrolizumab and a Phase 3 Trial of Adagrasib in Combination with Pembrolizumab versus Pembrolizumab in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer with KRAS G12C Mutation

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC ▪ KRAS G12C Mutation ▪ PD-L1 $\geq$ 50%	▪ Adj. oder neoadj. System- oder Radiochemo-Therapie $\leq$ 6 Monate vor der ersten Gabe IMP ▪ Strahlentherapie der Lunge >30Gy in den letzten 6 Monaten

REZILIENT-4

TAS6417-302: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Multi-Center Phase 3 Study of Ziplertinib Plus Adjuvant Chemotherapy Versus Placebo Plus Adjuvant Chemotherapy in Stage IB-IIIa NSCLC Patients with Uncommon EGFR Mutations Following Complete Tumor Resection

Inclusion	Exclusion
▪ NSCLC Adeno ▪ Komplette Resektion des NSCLC im Stadium IB, IIA, IIB oder IIIA ▪ a. exon20 insertion mutations oder b. andere uncommon, non-ex20ins <i>EGFR</i>mt wie z. B. G719X, L861Q, or S768I	▪ Pre-operative or post-operative or planned radiation therapy for the current lung cancer ▪ neoadjuvante systemische Therapie ▪ Segment oder Keil- Resektion

Onkologische Studien Pleuramesotheliom

eVOLVE-Meso 2 - AstraZeneca

Eine multizentrische Phase-II-Studie nach einem Masterprotokoll zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Volrustomig als Monotherapie oder in Kombination mit Antikrebsmitteln bei Teilnehmern mit fortgeschrittenen/metastasierten soliden Tumoren

Inclusion	Exclusion
▪ Fortgeschrittene, inoperable Erkrankung, die nicht durch eine Operation mit kurativer Absicht behandelt werden kann ▪ ECOG: 0-1	▪ Andere aktive maligne Erkrankung ▪ Autoimmunerkrankung ▪ Aktive / offene Tuberkulose ▪ Akute Hepatitis

TIGER Meso - Novocure

TTFields in der allgemeinen klinischen Routineversorgung bei Patienten mit Pleuramesotheliom

Inclusion	Exclusion
▪ Histologisch bestätigtes Pleuramesotheliom ohne Option auf kurative Resektion ▪ Geplante Behandlung mit dem NovoTTF 200T System gemäß der IFU und den medizinischen Leitlinien	▪ Vorherige Behandlung mit TTFields für mehr als eine Woche bei Studieneinschluss

Onkologische Studien SCLC